

SIMAKTIV

simetikon + aktivno oglje

dvoslojne tablete s prirejenim sproščanjem
medicinski pripomoček



Z dvojnim učinkom odpravi pline v prebavilih!



zmanjšuje napenjanje



lajša bolečine in želodčne krče



normalizira prebavo



zmanjša spahovanje



deluje po 15minutah



enostavno odmerjanje: 2 x 2 tableti po dveh glavnih obrokih



DVOSLOJNA TABLETA

SIMETIKON

50 mg

ZMANJŠUJE NAPENJANJE

spremeni površinsko napetost
zračnih mehurčkov plina, ki v
prebavilih razpadejo



AKTIVNO OGLJE

300 mg

ANTIPLATULENTNI UČINEK

veže sproščene pline in jih
z blatom izloči
iz telesa

Simetikon in aktivno oglje se s svojim učinkom
medsebojnopolnujeta. Imata izključno mehansko in fizikalno delovanje.¹

Vir:

1. NTCsrl, Tehnična dokumentacija – Device description_190204



Pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE(0426).
Proizvajalec: NTCsrl, Razza3, 20124 Milano, Italija

Odgovoren za trženje: Bonifar d.o.o.
Datum priprave informacije: marec 2024

Navodila za pripravo na ultrazvočno preiskavo trebuha

Ultrazvok trebuha (abdomna) je ena najpogostejših diagnostičnih preiskav, ki omogoča temeljit pregled notranjih organov trebušne votline, vključno z jetri, žolčnikom, vranico, trebušno slinavko, ledvicami, nadledvičnicami in mehurjem. Pri ženskah prikaže tudi maternico in jajčnike, pri moških prostato. Ta neinvazivna, neškodljiva in neboleča metoda uporablja visokofrekvenčne zvočne valove za ustvarjanje slik notranjosti telesa, kar omogoča odkrivanje različnih bolezenskih sprememb, kot so ciste, kamni, tumorji ali vnetja, primerna je za spremljanje napredovanja bolezni in odziva na zdravljenje. Zaradi varosti in učinkovitosti je idealna za redne preglede in je primerna za vse paciente, vključno z nosečnicami in otroki.

Pred preiskavo

Pri pripravi na ultrazvočni pregled trebuha je pomembno upoštevati nekaj navodil.

- Dan pred pregledom uživajte lahko prebavljivo hrano, ki ne napenja. To zagotavlja zmanjšanje količine plinov v črevesju in boljšo vidljivost notranjih organov. Izogibajte se težkim, mastnim obrokom.
- Na dan pregleda bodite tešči najmanj 6 do 8 ur pred preiskavo, kar pomeni, da ne smete zaužiti nobene hrane ali pijače (niti kave, mleka ali smetane) razen negazirane vode ali nesladkanega čaja. Za pregled v dopoldanskem času je praviloma zadnji obrok večerja, za pregled v popoldanskem času pa zajtrk. Na dan pregleda ne žvečite žvečilnega gumija.
- Zdravila, ki jih redno jemljete, vzemite kot običajno.
- Zaželeno, da na dan pregleda odvajate blato.
- Za pregled organov v spodnjem delu trebuha, morate imeti poln sečni mehur, zato popijte približno pol litra negazirane vode eno uro pred preiskavo in zadržite urin do konca preiskave.
- Nosite udobna oblačila, ki omogočajo enostavno dostopnost do trebuha.
- S seboj prinesite vso relevantno medicinsko dokumentacijo (izvide predhodnih ultrazvočnih preiskav trebuha, izvide zdravnikov specialistov) in seznam zdravil, ki jih jemljete.
- Če imate posebna zdravstvena stanja, kot je sladkorna bolezen, se glede sprememb pri uživanju hrane in pijače posvetujte z osebnim zdravnikom.

Kako poteka preiskava?

Med ultrazvočnim pregledom trebuha boste ležali na hrbtu na pregledovalni mizi. Morda se boste morali obrniti ali spremeniti položaj, da s tem omogočite boljši pregled določenega organa. Zdravnik bo na vaš trebuh nanesele gel, s katerim bo omogočil lažje drsenje po koži in ustvaril boljši kontakt za prenos ultrazvočnih valov ter s tem kvalitetnejšo sliko. Sondo, ki oddaja in sprejema ultrazvočne valove, bo nežno pritiskal in premikal po vašem trebuhu. Morda bo treba za kratek čas zadržati dih, s čimer se zagotovi natančnost slike. Preiskava običajno traja od 15 minut do ene ure.

Po preiskavi

Po končanem pregledu si boste obrisali gel in se oblekli ter nadaljevali s svojimi običajnimi aktivnostmi, saj ultrazvočna preiskava ne zahteva okrevanja ali posebne oskrbe in ne bo vplivala na vaše počutje.

Zdravnik bo pripravil izvid in v njem opisal morebitne nepravilnosti ali potrdil normalno stanje vaših trebušnih organov.

Če rezultati ne bodo pokazali težav, dodatni postopki ne bodo potrebni. Če bo zdravnik odkril nepravilnosti ali stanja, ki zahtevajo ukrepanje, vas bo seznanil z nadaljnjimi koraki. To lahko vključuje dodatne preiskave, specialistične preglede ali posebne terapijske postopke. Poskrbel bo, da boste prejeli informacije za nadaljnje odločitve glede vašega zdravja in zdravljenja.

Pripravil mag. Manfred Mervic, dr. med., spec. internist, spec. gastroenterolog