

benzidaminijev klorid

**TANTUM
VERDE®**

50 let
z vami

**Lajšanje bolečine in
oteklin pri vnetju
v ustni votlini
in žrelu**

Pred uporabo natančno preberite navodilo!
Otveganju in neželenih učinkih se posvetujte z
zdravnikom ali s farmacevtom.

www.tantum-verde.si

Lajšanje bolečine in oteklin pri vnetju v ustni votlini in žrelu



TantumVerde 1,5 mg/ml
oralno pršilo, raztopina

Pakiranje: 30 ml

Pogostnost odmerjanja:
vsake 1,5 do 3 ure

Odrasli in mladostniki, stari od 12 do 18 let: 4 do 8 razprškov 2- do 6-krat na dan

Otroci, stari od 6 do 12 let: 4 razprški 2- do 6-krat na dan

Otroci, mlajši od 6 let: 1 razpršek na 4 kg telesne mase; do največ 4 razprške 2- do 6-krat na dan

Otroci morajo zdravilo uporabljati pod nadzorom odraslih.

Tantum Verde 3 mg/ml
oralno pršilo, raztopina

Pakiranje: 15 ml

Pogostnost odmerjanja:
vsake 1,5 do 3 ure

Odrasli in mladostniki, stari od 12 do 18 let: 2 do 4 razprški 2- do 6-krat na dan

Otroci, stari od 6 do 12 let: 2 razprška 2- do 6-krat na dan

Otroci, mlajši od 6 let: 1 razpršek na 8 kg telesne mase; do največ 2 razprška 2- do 6-krat na dan



Tantum Verde z okusommenta 3 mg pastile

Tantum Verde z okusom limone 3 mg pastile

Tantum Verde z okusompomaranče in medu 3 mg pastile

Pakiranje: 20 pastil

Odrasli in otroci, starejši od 6 let:
1 pastila 3-krat na dan

Otrokom, stari od 6 do 11 let, je treba zdravilo dajati pod nadzorom odraslih.



Tantum Verde 1,5 mg/ml raztopina za grgranje in izpiranje ust

Pakiranje: 120 ml in 240 ml

Odmerjanje:

15 ml (1 jedilna žlica) nerazredčene raztopine za grgranje in izpiranje ust uporabljamo 2- do 3-krat na dan po obroku.

Zdravila ne smejo uporabljati otroci in osebe, ki niso zmožne nadzorovati refleksa požiranja, pri katerih bi uporaba zdravila lahko povzročila zadušitev.

Uporabazdravila je dovoljena med nosečnostjo in dojenjem, če ga uporabljate v skladu z navodili za uporabo.

Datum priprave informacije: december 2024



ANGELINI

Odgovoren za trženje:
Bonifar d.o.o.